

# NeemAzal®

Prírodný insekticíd  
proti savým a žravým škodcom


## Účinná látka

Azadirachtin A 1% (10 g/l) – Prírodný výťažok zo semien tropickej rastliny Azadirachta indica. Účinkuje na väčší hmyz ako napr. húsenice a pásavka zemiaková

## Popis

Prírodný insekticídny prípravok vyrobený z výťažkov tropickej rastliny Azadirachta indica, pôsobiaci proti voľne žijúcim savým a žravým škodcom. Účinná látka sa drží na povrchu listov a aj preniká do listov a je čiastočne systematicky distribuovaná v rastline. Prípravok NeemAzal zastavuje požerovú aktivitu škodcov. Počas krátkeho obdobia po aplikácii prestávajú byť škodcovia aktívny. Larvy na postrek reagujú znížením požerovej aktivity a utlmeným vývojom s následnou mortalitou. Dospelé jedince (imága) vykazujú inhibíciu žeru, neplodnosť a v menšej miere mortalitu, populácia ďalej nevyvíja a skolabuje. Kolónie škodcu sú ešte nejaký čas viditeľné, ale larvy už sa nevyvíjajú.

## 2 hodiny od aplikácie



38% preniká do listu 62% zasichá na povrchu listu

## Aplikácia

Postrekom na list, odporúčame vystriekať porast aj z vnútra a pod listami. Pokiaľ nastane do 8 hodín po aplikácii dážď, je nutné ošetrenie opakovať. NeemAzal-T/S sa obvykle aplikuje pri napadnutí, resp. pri objavení prvých príznakov škodlivých organizmov. NeemAzal-T/S účinný bioinsekticíd proti cicavým a žravým škodcom. Účinkuje najlepšie na ranné štádiá škodlivého hmyzu, preto je dôležité previezť ošetrenie bezprostredne po vyliahnutí lariev.



## Dávkovanie:

**Zemiaky:** 25 ml/ 100 m<sup>2</sup> (2,5 l/ha), s odstupom 7 dní, max. 2x za vegetáciu

**Vinič:** 30 ml/ 100 m<sup>2</sup> (3 l/ha), s odstupom 7 – 14 dní, max. 2x za vegetáciu do fázy kvitnutia (BBCH 61)

**Bylinky:** 30ml/ 100 m<sup>2</sup> alebo (3 l/ha), s odstupom 7 – 10 dní, max. 3x za vegetáciu

**Špenát:** 30 ml/ 100 m<sup>2</sup> (3 l/ha), s odstupom 7 – 10 dní, max. 3x za vegetáciu

**Kapustová zelenina:** 30 ml/ 100 m<sup>2</sup> (3 l/ha), s odstupom 7 – 10 dní, max. 3x za vegetáciu.

**Tekvicovitá zelenina:** 30 ml/ 100 m<sup>2</sup> (3 l/ha), s odstupom 7 – 10 dní, max. 3x za vegetáciu

**Rajčiaky a baklažán:** 30 ml/ 100 m<sup>2</sup> (3 l/ha), s odstupom 7 – 10 dní, max. 3x za vegetáciu

**Jadroviny (okrem hrušiek):** 15 ml/ 100 m<sup>2</sup> do 10 l vody alebo 4,5 l/ha, s odstupom 10 – 14 dní, max 4x za vegetáciu, prípravok aplikujte najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 69)

**NeemAzal-T/S** sa aplikuje pri napadnutí a to ráno alebo večer v udanej dávke. Aplikujeme 1,5 l prípravku na 1 výškový meter koruny stromu. Množstvo vody 300 – 1000 l/ha v závislosti od druhu porastu. Neošetrujte porasty pri silnom slnečnom žiarení.

## Upozornenie

NeemAzal-T/S je ako prípravok na báze oleja je rastlinami všeobecne dobre znášaný. Vzhľadom na meniace sa podmienky v priebehu roku a rozdielmi medzi rastlinnými druhmi a odrodami sa nedá vylúčiť, že v ojedinelom prípade dôjde i k poškodeniu necitlivých rastlín.

**Ovocinárstvo: NEAPLIKUJTE NA HRUŠKY!** Pri odrodách hrušiek Conference, Alexander Lukas, BristolCross, ClaraFrijs, Comice, Guyot, HW606, Ingeborg, Illinois 13b 83 Maxi, Lectier, Trevoux, Winterdechant a Frijs sa pri predávkovaní môžu objaviť fyto toxické účinky na listoch

**Zeleninárstvo:** Na mladých rastlinách sa môžu objaviť mierne fyto toxické účinky na listoch (zvlnenie, stočenie).

**Ochranná doba:** Zelenina 3 dni, špenát 7 dní, koreňová zelenina 14 dní

**Miešateľnosť:** Nie je možné miešať s prípravkom Cocana a s prípravkami Novodor FC, Biobit XL, Biobit WP

**Skladovateľnosť:** 12 mesiacov pri teplote 10 – 20 °C



NeemAzal je priateľský k užitočnému hmyzu.