

Obsahuje tekuté organické látky rastlinného pôvodu.  
Podporuje rast a vývoj koreňového systému.  
Zlepšuje transport a dostupnosť mikroživín.  
Priaznivo ovplyvňuje dozrievanie plodov.  
Znižuje opadávanie plodov po odkvitnutí.  
Vyrovnáva hormonálnu rovnováhu rastlín.  
Obnovuje a aktivuje mikrobiálnu flóru v pôde.

Obsah živín	
Obsah humínových kyselín	25 % h/h
Obsah fulvo kyselín	25 % h/h
Celkový obsah dusíka (N)	4,5 % h/h
Celkový obsah fosforu (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	1,0 % h/h
Celkový obsah draslíka (K <sub>2</sub> O)	1,0 % h/h
Celkový obsah organických látok	45,0 % h/h

#### Obsah rizikových látok

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojivá platné v Slovenskej republike. Zoznam vzájomne uznaných hnojív pod číslom 252.

#### Upozornenie

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.  
V prípade nejasností kontaktujte svojho distribútora.  
Spoločnosť nie je zodpovedná za nesprávne použitie prípravku.

#### Bezpečnostné pokyny

Po vytvorení roztoku ihneď aplikujte, neskladujte. Nevystavujte zvýšeným teplotám a chráňte pred priamym slnečným žiarením. Hnojivo sa môže kombinovať s väčšinou bežne používaných prípravkov. Vždy sa odporúča urobiť skúšku kompatibility.

Hnojivo skladujte pri teplote 5 až 35 °C.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku starostlivosť. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s platnými miestnymi a národnými predpismi. Obsahuje: oktilinón (ISO), 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Národné Toxikologické Informačné Centrum (NTIC) 24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166.

#### Výrobca:

AgriTecnico Fertilizantes S.L.  
a member of Ajinomoto Group  
Paseo de Ruzafa 20, 1 - 4<sup>a</sup>, 46002, Valencia (SPAIN)  
(+34) 963 391 184 I contact-us@agritecnico.es  
www.agritecnico.es

UFI: PH30-N0KY-Q00P-XSNJ



8 437019 156053



Pozor

# Biostimulant na podporu rastu koreňovej sústavy

## Tekuté hnojivo

### Obsah balenia: 1 l

Distribútor  
ORGANIX, s.r.o.  
Rastislavova 1067/323  
951 41 Lužianky  
e-mail: info@organix.sk  
www.organix.sk  
www.bioochrana.sk

**Agriful** - je vhodný na použitie pre všetky typy plodín: obilniny, olejiny, zelenina, zemiaky, ovocie, vinič, kvety a okrasné rastliny.

#### Spôsob použitia

**Agriful** hnojivo aplikujte do koreňovej oblasti prostredníctvom zavlažovacieho systému alebo postrekovačom, ktoré zaručí prienik hnojiva ku koreňom.

Použitie hnojiva sa odporúča v priebehu celého vegetačného obdobia, keď má rastlina dostatok listov - po presadení, v období rastu, pučania, kvitnutia a vývoju plodov až po zber. Taktiež sa používa na prekonanie následkov stresových situácií.

Plodina	Termín aplikácie	Dávka na 10 litrov vody
Olejiny (mak), okopaniny (zemiaky), kukurica...	Aplikácia do jamky pri sadení. Aplikácia po povzchádzaní keď treba naštartovať príjem rastlín koreňmi.	30 – 50 ml
Cibuľoviny a hluzoviny Koreňová zelenina	Aplikujte 10 alebo 15, 30, 45 a 60 dní po presadení a alebo po vzídení rastliny.	50 ml
Jadroviny Kôstkoviny	Aplikujte na začiatku plnej koreňovej aktivity a v čase pučania. Opakujte každých 15 - 20 dní až do konca vegetatívneho cyklu.	100 ml 50 ml
Listová zelenina	Aplikujte 10 alebo 15, 25, 40 a 55 dní po povzchádzaní, po presadení.	50 ml
Plodová zelenina	Aplikujte 10 - 15 dní po vzídení alebo presadení rastliny a opakujte každých 7 - 10 dní.	30 – 50 ml
Jahody	Aplikujte 10 - 15 dní po presadení a na začiatku produkcie, opakujte každých 7 dní.	50 ml 30 – 50 ml
Vinič	Aplikujte na začiatku plnej koreňovej aktivity a pučania každých 15 dní až do zberu. Po zbere aplikujte 2 dávky po 15 dňoch.	50 ml 50 ml

