

**VYSOKÁ KONCENTRÁCIA
AMINOKYSELÍN RASTLINNÉHO
PŮVODU**

**URÝCHĽUJE RAST A VÝVOJ PLODÍN
POMÁHA ZOTAVENIU SA RASTLINY V
STRESOVÝCH SITUÁCIACH
A NAPOMÁHA TRANSPORTU LÁTKO
V RASTLINE.**

OBSAH ŽIVÍN

Celkový obsah aminokyselín	14,4	%
Vofné aminokyseliny "L"	12	%
Celokvový obsah dusíka (N)	7	%

OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTKO

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojivá platné v Slovenskej republike. Zoznam vzájomne uznaných hnojív pod číslom 250

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

P102: Uchovávajújte mimo dosahu detí.
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
EUH070: Toxické pri kontakte s očami.
Len na odborné použitie.
Hnojivo skladujte pri teplote 5 až 55 °C
Po vytvorení roztoku ihneď aplikujte, neskladujte.
Nevystavujte zvýšeným teplotám a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Hnojivo sa môže kombinovať s väčšinou bežne používaných prípravkov.
Vždy sa odporúča urobiť skúšku kompatibility.

UPOZORNENIE

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie. V prípade nejasností kontaktujte svojho distribútora. Spoločnosť nie je zodpovedná za nesprávne použitie prípravku

Číslo šarže: *****
Dátum výroby: MM/YYYY
Dátum spotreby: MM/YYYY

Tecamin Max

BIOSTIMULANT S VYSOKOU KONCENTRÁCIU L - AMINOKYSELÍN RASTLINNÉHO PŮVODU

Tekuté hnojivo určené na foliárnu aplikáciu.

Obsah balenia: 1 l

DISTRIBÚTOR
ORGANIX, s.r.o.
Rastislavova 1067/323
951 41 Lužianky
e-mail: info@organix.sk
www.organix.sk
www.bioochrana.sk



Výrobca:

Agritecno Fertilizantes, S.L.
Paseo Ruzafa, 20, Esc1-4º - 46002 Valencia (España)
Tel: + 34 963 391 184 - Fax: + 34 963 269 823

www.agritecnofertilizantes.com - e-mail: info@agritecnofertilizantes.com

Tecamin Max, je vhodný na použitie pre všetky typy plodín: vinič, obilniny, cukrová repa, zelenina, ovocie, kvety a okrasné rastliny.

FOLIÁRNA APLIKÁCIA :

- Používa sa roztok s **0,5% - 1,5%** koncentráciou.
- Pre uplatnenie transportného účinku aplikujte od **0,1%**.

PLODINA	TERMÍN APLIKÁCIE	l/ha
Vinič	Aplikujte v období nalievania púčikov (včielok), pučania, rastu výhonkov a po vývoji plodu.	1-3
Pšenica, jačmeň, ovos	Aplikujte keď má rastlina 4 - 5 listov a na začiatku kvitnutia. Vždy, keď je rastlina v strese.	1-2
Cukrová repa	Realizujte aplikácie v nasledujúcich vegetatívnych štádiách: 4 - 6 listov, 6 - 8 listov a 8 - 10 listov. Vždy, keď je rastlina v strese.	0,5-2
Plodová zelenina, strukoviny	Aplikujte od začiatku až po koniec vývoja plodiny každých 7 - 10 dní.	1,5-2
Zelenina (cibuľa, cesnak, zemiaky, listová zelenina, Hľubová zelenina)	Aplikujte po prekonaní stresových situácií. Vždy, keď je rastlina v strese.	1-3
Jadroviny Kôstkoviny	Aplikujte 1-2krát v období pučania a po vývoji plodov.	3
Jahody	Aplikujte od začiatku produkcie až po koniec každých 7- 10 dní.	1-3

Lúky a pasienky	Aplikujte 10 - 15 dní po každom kosení.	1-2
------------------------	---	-----

