

## OBSAH ŽIVÍN

Voľné aminokyseliny "L"	6,0 %
Zinok (Zn)	8,0 %

## OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojivá platné v Slovenskej Republike.

Číslo certifikátu 1375.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P270: Pri používaní výrobku nejezte, nepite ani nefajčite. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Len na odborné použitie. Obsahuje: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa- and hepta hydrate)

Hnojivo skladujte pri teplote 5 až 55 °C

Po vytvorení roztoku ihneď aplikujte, neskladujte.

Nevystavujte zvýšeným teplotám a chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pred zmiešaním s fosforom a veľmi alkalickými prípravkami urobte skúšku kompatibility.

Hnojivo sa môže kombinovať s väčšinou bežne používaných prípravkov.

Vždy sa odporúča urobiť skúšku kompatibility.

## UPOZORNENIE

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

V prípade nejasností kontaktujte svojho distribútora.

Spoločnosť nie je zodpovedná za nesprávne použitie prípravku.



Číslo šarže: \*\*\*\*\*

Dátum výroby:MM//YYYY

Dátum spotreby:MM//YYYY

Ref: XA0407SK10SLO01

Nebezpečenstvo

# Tecnokel Amino Zn

## PREVENIA PRI NEDOSTATKU ZINKU

Tekuté hnojivo pre foliárnu a koreňovú aplikáciu

Obsah balenia: 1 l

## DISTRIBÚTOR

ORGANIX, s.r.o.

Rastislavova 1067/323

951 41 Lužianky

e-mail: [info@organix.sk](mailto:info@organix.sk)

[www.organix.sk](http://www.organix.sk)

[www.bioochrana.sk](http://www.bioochrana.sk)



## Výrobca:

Agritecno Fertilizantes, S.L.

Paseo Ruzafa, 20, Esc1-4º - 46002 Valencia (España)

Tel: + 34 963 391 184 - Fax: + 34 963 269 823

[www.agritecnofertilizantes.com](http://www.agritecnofertilizantes.com) - e-mail: [info@agritecnofertilizantes.com](mailto:info@agritecnofertilizantes.com)

**Tecnokel Amino Zn** je vhodný na použitie pre všetky typy plodín: zelenina, ovocie, vinič, kvety a okrasné rastliny.

## SPÔSOB POUŽITIA

Prípravok sa používa ako doplnok k fertilizácii. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte keď je rastlina vo fáze rastu, najmä po zavlažovaní alebo po daždi.

Dávkovanie a frekvencia hnojenia závisí od stupňa deficitu zinku, vegetatívneho rastu a vývoja plodu.

**KOREŇOVÁ APLIKÁCIA:** hnojivo aplikujte do koreňovej oblasti prostredníctvom kvapkového zavlažovacieho systému, injektážneho zariadenia, postrekovačom alebo prostredníctvom zariadenia na fumigáciu, ktoré zaručí prienik hnojiva ku koreňom.

**FOLIÁRNA APLIKÁCIA:** sa odporúča na rýchlu korekciu obsahu zinku alebo v prípade, že aplikáciu zálievkou nie je možné uskutočniť.

PLODINA	APLIKÁCIA ZÁLIEVKOU	FOLIÁRNA APLIKÁCIA
Lan, kukurica, cirok, pšenica	Aplikujte v 1-2 dávkach 5-10 l/ha v období od 10.-15. dňa po vyklíčení alebo presadení do kvitnutia. Dávkovanie závisí od stupňa deficitu zinku a vlastností pôdy.	Nizky deficit Zn: 1 - 2 L/Ha. Stredný deficit Zn: 2-2,5 L/Ha Výrazný deficit Zn: 2,5-3 L/Ha  Aplikujte pri výške rastliny 15-30 cm alebo keď sa prejavia príznaky nedostatku zinku.
Jadroviny Kôstkoviny	Aplikujte podľa veku, vývinu stromu, vlastností pôdy a stupňa deficitu zinku. Stromček v škôlke: 5-15 cm <sup>2</sup> /stromček Mladýstrom: 15-50 cm <sup>2</sup> /strom Dospelý strom: 50-150 cm <sup>2</sup> /strom	Aplikujte pri dostatočnom novom zalíšení v priebehu jari, pri výraznom deficite zinku opakujte každé dva týždne. Nepoužívajte v čase kvitnutia.
Zelenina	Aplikujte v 1-2 dávkach 5-10 l/ha v období od 10.-15. dňa po vyklíčení alebo presadení do kvitnutia. Dávkovanie závisí od stupňa deficitu zinku a vlastností pôdy.	Aplikujte od 4. až 8. listu do začiatku kvitnutia.
Okrasné rastliny/ Kvety	Aplikujte 4-6 l/ha pri miernom nedostatku zinku a 6-8 l/ha pri stredne silnom nedostatku. Rozdeľte do viacerých aplikácií a opakujte každých 7-10 dní.	Aplikujte pri dostatočnom novom zalíšení. Opakujte podľa stupňa nedostatku zinku každých 10-14 dní. Nepoužívajte v čase kvitnutia.
Cukrová repa		Aplikujte pri 4. až 6. liste rastliny, ak je potrebné opakujte každých 10-14 dní.
Vinič	Aplikujte na začiatku jari, v čase pučania a pri miernom nedostatku zinku 3-5 l/ha, pri strednom nedostatku 5-7 l/ha a pri výraznom nedostatku 7-10 l/ha. Rozdeľte do viacerých dávok.	Aplikujte pri dostatočnom novom zalíšení v priebehu jari. Nepoužívajte v čase kvitnutia.

