

Výrazne podporuje odnožovanie, vetvenie rastlín. Nedostatok mangánu na rastlinách sa začína prejavovať žltými chlorotickými škvrnami v medzilizovom priestore na listoch, Neskôr sa vyvinú malé nekrotické lézie, ktoré prechádzajú do veľkých chlorotických plôch. Medzi symptómy nedostatku mangánu patrí aj redukcia listovej plochy a skučeraenie okrajov listov. Mangán je spojený s oxidačno - redukčnými reakciami a so syntézou chlorofylu v rastlinách. Je zložkou enzýmov, ktoré sa podieľajú na dýchaní a je nevyhnutný pre fotosyntézu

OBSAH ŽIVÍN

Mangán (Mn)	6.0 %
Voľné ^L aminokyseliny	6.0 %

Kyselina etyléndiamintetraoctová (EDTA)

OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTKO

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojivá platné v Slovenskej Republike.

Číslo certifikátu 1326

SKLADOVANIE, MIEŠATEĽNOSŤ

Rozmiešaný vo vode aplikujte, neskladujte. Nevystavujte vysokým teplotám, chráňte pred slnečným žiarením. Je možné miešať s väčšinou bežne používaných prípravkov. Vždy odporúčame vykonať test miešateľnosti.

UPOZORNENIE

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Skladujte mimo dosah detí, zvierat, potravín a vodných zdrojov. V prípade nejasností kontaktujte svojho distribútora. Spoločnosť nie je zodpovedná za nesprávne použitie prípravku a ručí za prípravok len v originálnom balení. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H412: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Len na odborné použitie. Obsahuje:manganese sulphate

PREVENIA A KOREKCIA NEDOSTATKU MANGÁNU

Biostimulant na listovú a pôdnu aplikáciu.

Obsah balenia: 1 l

DISTRIBÚTOR

ORGANIX S.R.O
Rastislavova 1067/323
951 41 Lužianky
e-mail: info@organix.sk
www.organix.sk
www.bioochrana.sk



Výrobca:

Agritecno Fertilizantes, S.L.
Paseo Ruzafa, 20, Esc1-4º - 46002 Valencia (España)
Tel: + 34 963 391 184 - Fax: + 34 963 269 823
www.agritecnofertilizantes.com - e-mail: info@agritecnofertilizantes.com

Tecnoel Amino Mn doporučujeme pre všetky rastliny : poľné plodiny, zeleninu, ovocné stromy, vinič, okrasné rastliny....

SPÔSOB POUŽITIA

PÔDNA APLIKÁCIA. Mangán sa musí dostať do koreňovej zóny aby sa zaistil príjem rastlinami. Dosiachneme to zavlažením, aplikáciou pred dažďom alebo zapracovaním do pôdy.

LISTOVÁ APLIKÁCIA Doporučujeme, keď je nevyhnutná rýchla korekcia nedostatku mangánu alebo pôdna aplikácia je nemožná.

Najlepší výsledok pri aplikácii **Tecnoel Amino Mn** dosiahneme, keď sú rastliny v intenzívnom raste, pri zavlažovaní alebo dostatočných zrážkach. Tento prípravok doporučujeme ako doplnok k základnému hnojeniu.

DÁVKA A TERMÍN APLIKÁCIE závisia od miestnych podmienok : plodiny, fázy rastu a závažnosti nedostatku mangánu.

PLODINA	PÔDNA APLIKÁCIA	LISTOVÁ APLIKÁCIA
		Mierny nedostatok : 1,0 – 2,0 l/ha Závažný nedostatok : 2,5 – 4,0 l/ha
Poľné plodiny: pšiblny, strukoviny, plejiny, okopaniny, krmoviny...	Aplikujte 1.5 l/ha – 3.5 l/ha v jednej alebo dvoch dávkach od 2. listu do kvitnutia kvapkovou závlahou alebo pôdnym aplikátorom.	Na podporu odnožovania v obilninách aplikujte od vytvorenia 2.listu, v kukurici a strukovinách od 4. listu, okopaniny do zapojenia porastu, repka vo fáze predžovacieho rastu, ostatné pri výške od 10 do 30 cm alebo po objavení symptómov nedostatku mangánu. Vždy pred kvitnutím.
Ovocné stromy: Jablone, hršky, bruskyne, slivky, čerešne, nektariny...	Aplikačná dávka na ovocné stromy závisí od veku stromov, veľkosti stromov, pôdnych podmienok a výšky nedostatku mangánu. Škôlka: 5-15 ml/strom Mladé stromy: 15-50 ml/strom Dospelé stromy: 50-150 ml/strom	Aplikujte začiatkom jari, hneď potom ako sú stromy plne olistené. Pri závažnom nedostatku mangánu, aplikáciu za 14 dní zopakujte. Nepoužívajte počas kvitnutia.
Vinič	Aplikujte na začiatku jarnej sezóny: - Udržiavacia aplikácia: 3 - 5 l/ha. - Mierny nedostatok : 5 - 7 l/ha. - Závažný nedostatok : 7 - 10 l/ha. Celkovú dávku rozdeľte do niekoľkých aplikácií.	Aplikujte začiatkom jari, hneď potom ako je vinič plne olistený. Nepoužívajte počas kvitnutia.
Okrasné rastliny, kvety	- Udržiavací alebo mierny nedostatok: 4 - 6 l/ha. - Závažný nedostatok: 6 - 8 l/ha. Celkovú dávku rozdeľte do niekoľkých aplikácií, po 7 - 10dňoch.	Ak je prítomné dostatočné množstvo listov. Opakujte podľa potreby 10 až 14 dní. Nepoužívajte počas kvitnutia.
Cukrová repa		Od 4 - 6 listov, opakujte podľa potreby za 10 – 14 dní.
Zelenina	Aplikujte do kvitnutím 2,5 až 5 l / ha v jednej až dvoch aplikáciách. Dávka bude závisieť od rozsahu nedostatku a pôdnych podmienok.	Vo fáze 4 – 8 listov, nikdy počas kvitnutia.



Pozor

Číslo šarže: *****
Dátum výroby:MM//YYYY
Dátum spotreby:MM//YYYY

Ref: XA0406SK10SL001